



Indução da florada da Buganville

Lucas Pletsch Lazzarin, Nelson Geraldo Golinski

Instituto Federal Catarinense Campus Concórdia

Área: Agropecuária e afins

E-mail para contato: nelsongolinski@hotmail.com

A flor buganville, pertencente à família das Nictagináceas, é de origem brasileira. A buganville, também conhecida como primavera, três-marias ou flor-de-papel, é uma espécie rústica, muito cultivada e apreciada no mundo, especialmente no estado de Santa Catarina. O nome da planta foi dado em homenagem ao navegador francês Louis Antoine Bougainville, que a descobriu em nosso país, por volta de 1790 e a levou para várias partes do mundo. O objetivo do trabalho foi sanar dúvidas de pessoas que gostam de flores, tais como estudantes de cursos técnicos em agropecuária e paisagismo, jardineiros, paisagistas e demais apreciadores. Neste estudo, utilizou-se 20 plantas de dois anos de idade cultivadas em vasos, com adubo fosfatado. Foram feitas adubações fosfatadas a cada cinco dias por um período de 12 meses, utilizando 10g de adubo diluído em um litro de água e aplicado com regador. As adubações eram realizadas nas primeiras horas da manhã. Verificou-se que as 10 plantas que estavam sendo adubadas tiveram floração constante, independentemente da estação do ano. Já as plantas sem adubação fosfatada tiveram floração somente nos períodos de primavera e verão. Desta forma, conclui-se que as plantas respondem bem à nutrição fornecida a elas e, neste caso, pode-se manter as buganviles floridas durante todo o ano, seja em vasos ou em jardins

Palavras-chave: Buganville, Primavera, Francês