Pesquisa de anticorpos contra o vírus da Leucose Enzoótica Bovina em amostras de soro de *Desmodus rotundus*

Keila Catarina Prior, Diogenes Dezen, Talita Carina Bogoni, Débora Cristina Olsson, Osmar Bordignon, Daniele Correia dos Santos Carneiro, Kaue Cesar Rossi, Pamela Maboni

IFC - Câmpus Concórdia

Área: Veterinária e afins

E-mail para contato: diogenes.dezen@ifc-concordia.edu.br

Os morcegos têm sido cada vez mais reconhecidos como fontes de vírus que podem causar doenças nos seres humanos e animais. Dentre as espécies de quirópteros com importância em saúde pública, podemos destacar o *Desmodus rotundus*. Popularmente conhecido como morcego-vampiro, esta espécie se distribui pelo México, América Central e do Sul, em selvas, bosques, zonas com vegetação e cidades. Nesta espécie já foi identificado o vírus da raiva, adenovírus, betaretrovírus endógeno, coronavírus e vírus da encefalite Venezuelana. Devido à raiva ser uma grande preocupação para a saúde pública, a maioria dos estudos sobre *D. rotundus* têm-se centrado sobre o seu papel na epidemiologia da doença. Um número bastante limitado de estudos vem sendo realizado para revelar o papel dos morcegos como reservatórios para outros vírus. O *D. rotundus* é o principal transmissor da raiva aos herbívoros, isto porque em zonas agrícolas da América Latina, o gado é a primeira fonte de alimento de morcegos hematófagos, entretanto pouco se sabe sobre o papel do quiróptero na disseminação de outras viroses em ruminantes. Portanto, o objetivo deste trabalho foi pesquisar o potencial papel do *D. rotundus* como reservatório do vírus da Leucose Enzoótica Bovina (BLV). Para isso, foram realizadas quatro capturas noturnas entre abril e junho de 2015, em quatro municípios da região Oeste de Santa Catarina, totalizando 50 animais. As capturas foram feitas com redes de neblina colocadas próximas aos abrigos. Após a captura, os animais foram transportados em gaiolas até o bloco cirúrgico, onde foi realizada a indução anestésica com halotano ou sevoflurano. Na sequência, foi colhido sangue por punção intracardíaca, o material foi centrifugado e o soro foi alíquotado e armazenado à -20°C. Para a detecção de anticorpos séricos contra o vírus da Leucose Enzoótica Bovina (BLV), foi utilizada a imunodifusão em gel de ágar (IDGA), utilizado kit comercial. Após 72 horas, efetuou-se a leitura das amostras e estas foram classificadas em positivas e negativas. Dos 50 animais, 49 (98%) foram negativos e 1 (2%) foi positivo para pesquisa de anticorpos séricos contra BLV. Este resultado sugere que o quiróptero teria se infectado e produzido resposta humoral contra o BLV. Portanto, é possível que o vírus esteja circulante na população de morcegos-vampiros; entretanto o papel desta espécie como agente disseminador do vírus ainda precisa ser elucidado (CEUA nº 36/2014 e SISBIO nº 43104).

Palavras-chave: *Desmodus rotundus*. BLV. IDGA.